

	Keine Früherkennung	Stuhltest	Darmspiegelung
Wie viele Männer erkranken an Darmkrebs?	Je nach Alter erkranken 7 bis 18 von 1.000 Männern an Darmkrebs.	Es ist nicht nachgewiesen, dass der Stuhltest Darmkrebs vorbeugen kann.	Durch eine Darmspiegelung erkranken bis zu 13 von 1.000 Männern weniger an Darmkrebs.
Wie viele Männer sterben an Darmkrebs?	Je nach Alter sterben 2 bis 6 von 1.000 Männern an Darmkrebs.	Durch den Stuhltest stirbt bis zu 1 von 1.000 Männern weniger an Darmkrebs.	Durch eine Darmspiegelung sterben bis zu 4 von 1.000 Männern weniger an Darmkrebs.
Wie oft kann ich die Untersuchung machen?		Sie könne alle 1 bis 2 Jahre einen Stuhltest machen.	Wenn die erste Darmspiegelung unauffällig war, können Sie nach 10 Jahren eine zweite Spiegelung wahrnehmen.
Wie zuverlässig ist die Untersuchung?		- Ein Stuhltest findet etwa 70 von 100 Tumoren. - Er übersieht jedoch viele Polypen und schlägt häufig falschen Alarm	- Eine Darmspiegelung findet etwa 95 von 100 Tumoren und die meisten größeren Polypen. - Die Polypen können direkt entfernt und untersucht werden.
Welche Komplikationen sind möglich?		Der Stuhltest selbst verursacht keine Komplikationen.	Bei 2 bis 3 von 1.000 Darmspiegelungen kommt es zu einer behandlungsbedürftigen Komplikation, zum Beispiel einer Blutung.