

Entfernung der Gebärmutter – teilweise oder ganz?

FRAGEN UND ANTWORTEN

	Teilweise Entfernung	Vollständige Entfernung
Wie läuft die Behandlung ab?	- Der Gebärmutterkörper wird entfernt. - Der Gebärmutterhals bleibt erhalten. Das kann für die Behandlung einer späteren Beckenbodenabsenkung nützlich sein.	Die gesamte Gebärmutter (Gebärmutterkörper und Gebärmutterhals) wird entfernt.
	Frauen werden meist schlüssellochchirurgisch über den Bauch operiert.	
Wie lange dauert die Behandlung?	Die Operation dauert in der Regel 1 bis 2 Stunden. Sie bleiben in der Regel 3 bis 6 Tage in der Klinik.	
Was ist das Ziel der Behandlung?	Die starken und sehr belastenden Beschwerden sollen verschwinden oder sich spürbar bessern.	
Wie wirkt sich die Behandlung auf meine Symptome und meine Lebensqualität aus?	- Welche Beschwerden aufhören oder sich stark bessern, hängt von Ihrer Erkrankung ab. - Starke und/oder lange andauernde Monatsblutungen werden aufhören oder sich stark bessern. Dadurch werden sich Ihre Beschwerden deutlich abnehmen und Ihre Lebensqualität wird steigen.	
	Ihr Risiko für Gebärmutterhalskrebs ändert sich nicht.	Ihr Risiko für Gebärmutterhalskrebs ist verringert, aber es ist nicht gleich Null.
Welche Komplikationen können auftreten?	- Bei wenigen Frauen können Blase oder Harnröhre verletzt werden (vermutlich bei bis zu 3 von 100 Frauen). - Bei wenigen Frauen können sich die Operationswunden infizieren (wahrscheinlich bei 1 von 100 Frauen).	
Werde ich vorzeitige Wechseljahre bekommen?	- Nein, Sie werden keine vorzeitigen Wechseljahre bekommen. - Die Eierstöcke bleiben erhalten. Diese produzieren weiterhin weibliche Geschlechtshormone. - Auch die vollständige Entfernung der Gebärmutter wirkt sich vermutlich kaum auf Ihren Hormonhaushalt aus.	
Werde ich Probleme mit dem Wasserlassen haben?	- Das kann man nicht vorhersehen. - Probleme mit dem Wasserlassen können neu auftreten. Wenn Sie bereits vor der Operation Probleme mit dem Wasserlassen haben, können die Probleme größer werden, bestehen bleiben oder auch geringer werden.	

Entfernung der Gebärmutter – teilweise oder ganz?

FRAGEN UND ANTWORTEN

	Teilweise Entfernung	Vollständige Entfernung
Wird es mein Sexualleben beeinflussen?	- Nach der Operation sollten Sie einige Wochen auf Geschlechtsverkehr verzichten. Danach sind viele Frauen mit ihrem Sexualleben zufrieden (im 1. Jahr nach der OP 40 bis 90 von 100 Frauen). - Geschlechtsverkehr ist meist nach 3 bis 4 Wochen möglich.	Geschlechtsverkehr ist meist nach 6 Wochen möglich.
Werde ich weiter Blutungen haben?	- Sie werden keine Monatsblutungen mehr haben. - Einige Frauen haben bis zum 2. Jahr nach Operation leichte Schmierblutungen (9 bis 14 von 100 Frauen)	Wenige Frauen haben bis zum 2. Jahr nach der Operation Schmierblutungen (1 bis 2 von 100 Frauen).