

Ein-Kammer-Herz – Thrombosevorsorge nach Fontan-OP?

FRAGEN UND ANTWORTEN

	Keine Thrombosevorsorge	Gerinnungshemmer	Plättchenhemmer
Was ist das Ziel der Behandlung?		Es soll verhindert werden, dass sich Blutgerinnsel bilden, die Ihre Blutgefäße einengen oder gar vollständig verstopfen. Damit soll zum Beispiel einem Schlaganfall oder einer Lungenembolie vorgebeugt werden.	
Wie wirkt sich die Behandlung auf thromboembolische Komplikationen aus?	Wahrscheinlich treten innerhalb von 7 Jahren bei etwa 19 von 100 Personen thromboembolische Komplikationen auf.	Wahrscheinlich treten innerhalb von 7 Jahren bei etwa 9 von 100 Personen thromboembolische Komplikationen auf.	
Wie wirkt sich die Behandlung auf meine Lebensqualität aus?	Es besteht wahrscheinlich ein höheres Risiko, dass eine thromboembolische Komplikation eintritt, die behandelt werden muss.	Sie brauchen sich weniger Sorgen zu machen, dass eine thromboembolische Komplikation eintritt.	
Darf ich Sport treiben?	Sie brauchen sich nicht auf bestimmte Sportarten zu beschränken.	Bei Kontaktsportarten wie zum Beispiel Fußball und Basketball mit intensiven Zweikämpfen oder Kampfsport sollten Sie zurückhaltend sein oder sie ganz meiden.	
Welche Nebenwirkungen können auftreten?		- Bei bis zu 2 von 100 Personen treten vermutlich innerhalb von 2 Jahren schwere bis lebensbedrohliche Blutungen auf. - Bei bis zu 33 von 100 Personen treten vermutlich innerhalb von 2 Jahren leichte Blutungen auf.	- Bei bis zu 2 von 100 Personen treten vermutlich innerhalb von 2 Jahren schwere bis lebensbedrohliche Blutungen auf. - Bei bis zu 14 von 100 Personen treten vermutlich innerhalb von 2 Jahren leichte Blutungen auf.
Welche Auswirkungen kann die Behandlung auf mein ungeborenes Kind haben?		Die Einnahme von Vitamin K-Antagonisten kann zu Fehlbildungen Ihres ungeborenen Kindes führen. Das Auftreten von Fehlbildungen ist dosisabhängig und in den ersten Schwangerschaftswochen gering.	- Acetylsalicylsäure können Sie in einer niedrigen Dosis (bis 150 mg am Tag) auch während der Schwangerschaft einnehmen. - Weder für Sie noch für Ihr ungeborenes Kind stellt Ihre Behandlung ein erhöhtes Risiko für Komplikationen dar.

Ein-Kammer-Herz – Thrombosevorsorge nach Fontan-OP?

FRAGEN UND **ANTWORTEN**

	Keine Thrombosevorsorge	Gerinnungshemmer	Plättchenhemmer
Wie hoch ist der Zeitaufwand im Alltag?		• Zeitaufwand ist größer als bei der Behandlung mit Plättchenhemmern.	• Der Zeitaufwand ist gering. • Die Blutgerinnung muss nicht kontrolliert werden.
Was ist außerdem wichtig zu wissen oder zu beachten?		• Es können Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten, aber auch mit Nahrungsmitteln auftreten.	